MEDCOF

REVALIDA

**Trauma: Introdução
e atendimento inicial**

Via aérea e imobilização coluna

Respiração e ventilação

Circulação

Disability

Exposição e Ambiente

Ao atendermos um trauma devemos seguir um fluxo organizado:

- No pré-hospitalar:
- Preparação e planejamento;
- Segurança da cena;
- As prioridades devem ser parar sangramento e garantir via aérea segura;
- Realizar transporte rápido e com segurança;
- Comunicação entre equipes:
- Ajuda a preparar a equipe hospitalar para receber o paciente vítima de trauma.

Na chegada ao hospital:

- Com o objetivo de passar as informações essenciais de maneira ágil do pré-hospitalar para a equipe hospitalar no momento inicial de chegada ao hospital utilizamos o mnemônico MIST:
- M – Mecanismo (ex: atropelamento);
- I – Injúrias (ex: trauma de tórax);
- S – Sinais vitais (PA, FC e SpO2);
- T – Tratamento (ex: IOT, AVP, 1L RL).

No ambiente hospitalar:

- Idealmente devemos ter a sala e equipe preparadas para receber o paciente;
- Realizar avaliação e tratamento simultâneos;
- Monitorização;
- Deve haver um protocolo (ABCDE);
- Reavaliar constantemente;
- Programar a transferência se necessário.

Ao abordar um paciente vítima de trauma, utilizamos a recomendação do ATLS para o ABCDE, sempre priorizando as condições que podem levar o paciente ao óbito mais rapidamente:

- A – Via aérea e coluna cervical:
- Abordagem de via aérea:
- Conversar com o doente:
- Não responde? Pode ser um indício de via aérea obstruída.
- Oferecer O2 15L/min com máscara não reinalante:
- Todo paciente vítima de trauma deve receber oxigênio.
- Colar cervical:
- Aplicar colar cervical e headblock:
- Importante colocar o paciente em prancha rígida para o transporte.
- Via aérea não pérvia:

A via aérea pode estar não pérvia em situações como: TCE, trauma de face, trauma cervical, hipóxia por choque, etc. Nesses casos, devemos proceder com a obtenção de uma via aérea segura.

- B – Respiração e ventilação:
- Avaliar pulmões, caixa torácica e diafragma através de sinais vitais e exame físico direcionado, com o objetivo de garantir boa oxigenação para os tecidos;
- Identificar problemas que podem causar insuficiência respiratória:
- Pneumotórax hipertensivo? Hemotórax? Obstrução de via aérea não identificada no A? Rebaixamento do nível de consciência?
- Tratar imediatamente □ Suporte clínico e ventilatório, drenagem de tórax se necessário.
- C – Circulação e controle de sangramento – devemos sempre ser agressivos com a identificação de choque:
- Parar sangramento e repor perdas:

O paciente vítima de trauma está sangrando até que se prove o contrário, devemos nos atentar para achar o foco de sangramento.

- Realizar exame físico direcionado e checar sinais vitais;
- O2 acessos venosos periféricos calibrosos – de preferência na fossa antecubital. Já aproveita e colhe exames e realiza a tipagem sanguínea;
- 1L de ringer lactato aquecido (39 graus celsius) – para todos. Se necessário transfundir e considerar transamin.
- D – “Disability”: • Avaliação neurológica direcionada:
- Escala de coma de Glasgow;
- Déficits neurológicos;
- Reatividade pupilar.
- Diagnóstico diferencial:
- Uso de drogas e etilismo, hipoglicemia, doenças de base.
- Caso suspeita de lesão neurológica:

Escala de coma de Glasgow

Parâmetro	Resposta	Pontos
Espontâneo	4
	Ao comando verbal	3
	À dor	2
	Nenhuma	1
Orientado	5
	Desorientado	4
	Palavras inapropriadas	3
	Sons incompreensíveis	2
	Nenhum	1
Obedece comando	6
	Localiza dor	5
	Flexão normal à dor	4
	Flexão anormal (decorticação)	3
	Extensão (descerebração)	2
	Nenhum	1
Leve	13-15
	Moderado	9-12
	Grave	8

Glasgow pupilar = glasgow - nº de pupilas com problema

Exemplo 1: Glasgow 7 + pupila não reage a luz = Glasgow-p 6
 Exemplo 2: G7 + duas pupilas não reagem a luz = Glasgow-p 5
 Exemplo 3: G7 + duas pupilas reagem a luz = Glasgow-p 7

- TC crânio + transferência para avaliação do neurocirurgião;
- Prevenir lesão secundária – hipóxia e hipovolemia.
- E – Exposição e controle do ambiente:
- Despir o doente:
- Retirar os acessórios.
- Movimentação em bloco:
- Para realizar a movimentação em bloco é preciso de 4 pessoas: 1 na cabeça, duas pessoas para movimentar o doente lateralmente ao mesmo tempo e uma quarta para realizar o exame físico.

- Controle da temperatura do ambiente:
- Hipotermia pode agravar o quadro.

Resumão

- 1º - Encontrei um problema = tratei de imediato:
- Ex: garantir via aérea, drenar o tórax, realizar cirurgia, transferir para o neurocirurgião;
- Reavalio a cada medida tomada:
- Esse protocolo é dinâmico, então pode ser que haja a necessidade de voltar para uma das etapas se o paciente apresentar piora naquele aspecto.
- 2º – Completou a avaliação primária – paciente estável:
- Transferência para tratamento definitivo;
- Avaliação secundária:
- Exame físico completo, pedir exames, tratamento definitivo.